

大肠癌

您可以预防

大肠癌的预防数据



第三 在美国，大肠癌在男性和女性都是第三大常见癌症，但也是最能够预防的癌症之一。

每23人中有一人

男性一生中患大肠癌的几率



每25人中有一人

女性一生中患大肠癌的几率



150,000+ 今年大肠癌的新发病例数

50,000+ 今年将死于大肠癌的人数

1990 据估计，1990年左右出生的人和1950年左右出生的人相比，患大肠癌的风险要高2倍，患直肠癌的风险要高4倍。虽然原因很复杂，但专家认为不健康的饮食和久坐不动的生活方式可能有所贡献。

癌症筛查可以拯救生命

45到75岁

患大肠癌的风险属于一般的成年人应该接受筛查

75岁以上

75岁以上的成年人是否继续筛查的决定应该因人而异

每10年一次或每年一次

大肠癌筛查的推荐检查是从45岁开始每10年进行一次结肠镜检查，或是每年进行一次粪便检查

摘除息肉可以减少大肠癌的风险和拯救生命。预防的力量！

- 了解更多: gi.org/coloncancer
- 如何找医生: gi.org/find-a-gastroenterologist
- 阅读更多: bit.ly/ACG2021-CRC-Guideline

一步法检查

结肠镜检查

结肠镜检查可以观察大肠里的息肉生长情况。医生可以在结肠镜检查的同时清除息肉以预防大肠癌的发生

两步法检查

粪便检查会查看微量血液。如果粪便检查呈阳性

或者

-部分结肠镜检查

或者

-成像测试

两步法检查

如果第一步呈阳性，则需要进一步进行结肠镜检查。

阳性结果？

第二步
结肠镜检查