

РАК ТОВСТОЇ КИШКИ

Ви можете попередити його

Дані щодо попередження раку товстої кишки



3-й

У Сполучених Штатах рак товстої кишки є третім за поширеністю раком як у чоловіків, так і у жінок, але це один із видів раку, розвиток якого можна попередити.

1 з 23

Ризик розвитку раку товстої кишки для чоловіків протягом життя



1 з 25

Ризик розвитку раку товстої кишки для жінок протягом життя



150,000+

Кількість нових випадків раку товстої кишки цього року

50,000+

Кількість людей, які помруть від раку товстої кишки цього року

1990

Було підраховано, що люди, народжені у 1990-х роках, мають вдвічі більший ризик раку товстої кишки і в чотири рази більший ризик раку прямої кишки, ніж ті, хто народився у 1950-х роках.

Хоча причини комплексні, експерти вважають, що цьому може сприяти нездорове харчування та малорухливий спосіб життя.

Скринінг на рак рятує життя

Вік від 45 до 75 років

Дорослі з середнім ризиком раку товстої кишки повинні пройти обстеження

Вік 75+ років

Рішення про продовження скринінгу для людей старше 75 років має прийматися індивідуально

Кожні 10 років або кожен рік

Колоноскопія кожні 10 років, починаючи з 45 років, або аналіз калу кожен рік є рекомендованими дослідженнями для виявлення раку товстої кишки.

Видалення поліпів знижує ризик раку товстої кишки та рятує життя. Сила профілактики!

❗ Щоб дізнатися більше: gi.org/coloncancer

🔍 Як знайти лікаря: gi.org/find-a-gastroenterologist

Читати більше: bit.ly/ACG2021-CRC-Guideline

Translation: 1-етапний тест

Колоноскопія

Колоноскопія – це дослідження, при якому проводиться пошук новоутворень, які називаються поліпами, у товстій і прямій кишці за допомогою камери. Ваш лікар може видалити поліпи під час колоноскопії та запобігти раку товстої кишки

2-етапний тест

1-й етап

– Аналіз калу перевіряє наявність мікроскопічної кількості крові
або
– КТ товстої кишки -відеокапсул
або
– часткова колоноскопія

Позитивний тест?

2-й етап
Колоноскопія